№ 82. Samedi, 13 Octobre 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY NOV 14 1906

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

HALLION. Spécificité des anticorps sensibilisatrice et alexine.

GEORGES PETIT. Origine intestinale de l'anthracose pulmonaire.

CONGRÈS

Xe Congrès de l'Association française de chirurgie (Paris, 1-6 Octobre 1906) (*suite*).

Discussion sur l'ectopie testiculaire et ses complications.

CHIRURGIE DU COU

Laryngotomie intercrico-thyroïdienne et décanulation chez l'enfant et l'adolescent. — Sur la laryngotomie. — De la dilatation élastique par les tubes de caoutchouc, dans les rétrécissements chroniques du larynx et de la trachée. — Traitement chirurgical du goitre exophtalmique. — Danger des amygdalites à répétition; avantages de l'ablation totale des amygdales à l'anse froide.

CHIRURGIE DE LA FACE

Procédé d'exérèse du cancer de la lèvre inférieure.

CHIRURGIE OCULAIRE

Traitement des tumeurs malignes intra-oculaires.

CHIRURGIE GÉNÉRALE

Actinomycose et tuberculose; réaction des actinomycosiques aux procédés de laboratoire employés pour le diagnostic de la tuberculose. — Les résultats de la vaccination antinéoplasique. — L'utilité des injections préventives de sérum antitétanique. — Anesthésie médullaire par la stovaïne; causes des échecs; moyens d'y parer. — Sur l'utilisation du protoxyde d'azote en chirurgie générale. — De l'anesthésie générale par la voie rectale. — Sur l'emploi de la scopolamine, comme anesthésique général.

PRÉSENTATIONS D'INSTRUMENTS

Errratum.

Ve Congrès de l'Association française d'urologie, Paris, 4-6 Octobre 1906.

Pathogénie et traitement des hydronéphroses.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Rosacées à acide cyanhydrique. — Transformation en levure pathogène des spores d'un champignon pathogène.

Société de thérapeutique. — Influence de l'automobile sur la santé.

ANALYSES

Pédiatrie. — J. MOREAU DE TOURS. Du suicide chez les enfants.

Neurologie et Psychiatrie. — L. MONGERI. Contribution à l'étude de l'étiologie de la paralysie générale.

CHRONIQUE

PIERRE MAUREL. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.

VARIÉTÉS

Polymastie et tuberculose.

PRATIQUE MÉDICALE

L'emploi possible de l'aluminium contre l'hydrargyrisme.

LIVRES NOUVEAUX

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur JOFFROY

Loin du centre, dans un quartier tranquille, à l'aspect provincial, se trouve l'asile Sainte-Anne où se fait deux fois par semaine la Clinique de pathologie mentale.

Pour y assister, après avoir sonné et franchi la grille d'entrée toujours close, on suit une longue avenue bordée de grands arbres, on passe à côté du tennis « réservé au personnel et aux pensionnaires »; on traverse des cours avec de nombreux pavillons. Partout est répandue une impression de calme, de tristesse, comme dans ces petites villes de province où la vie semble s'être retirée de la rue pour se réfugier derrière les façades. Ici, les quelques malades tranquilles qui remplissent les menues besognes dans les jardins ne font qu'accentuer cette sensation. Ils rappellent que derrière les murs vivent encore des êtres dont la raison agonise.

Et quand on arrive à l'amphithéâtre où se fait la leçon l'impression pénible subsiste. Les fenêtres donnent sur une des cours réservées aux malades. On y voit l'agité se démener avec grands cris et gestes de fureur, ou le mélancolique solitaire rêver douloureusement. L'amphithéâtre est une dépendance du pavillon Leuret, un des deux pavillons consacrés à la Clinique de pathologie mentale. On retrouve encore l'aspect d'un intérieur provincial dans cet amphithéâtre bien tenu, avec son mobilier qui date, ses parquets bien cirés comme on en voit peu dans les hôpitaux où la vie est intense, où, nombreux, passent, vont et viennent, étudiants et malades.

Malgré la distance et le caractère spécial des leçons, l'assistance est assez nombreuse : une cinquantaine d'auditeurs, dont plusieurs femmes.

Dans l'enceinte réservée, derrière la table à tapis vert, encadré de ses chefs de clinique et de ses internes, tous en blouse, le professeur Joffroy, en veston, la calotte de soie noire sur la tête, est confortablement assis sur un fauteuil de cuir à haut dossier avec larges appuis-bras.

* * *

La leçon commence presque toujours par l'audition d'un ou deux malades, précédée de quelques mots de présentation du Professeur avant l'entrée du sujet. Celui-ci introduit, le chef le met de suite en confiance en lui présentant l'auditoire : « Ces Messieurs sont réunis ici expressément pour entendre vos doléances et y faire droit, etc. » Et le malade, le plus souvent, de donner libre

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

POUDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique. Remplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins). SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT. La plus efficace des Préparations de Valériane. La plus facilement acceptée par les Malades. DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100) PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène) EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER. Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

Rhumatismes NÉVRALGIES, SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE. MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR L'ULMAROL. Liniment sans odeur incommodante. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharmac. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

FIGADOL en capsules de gluten — 1 capsule = 2 cuillerées de la meilleure huile de foie de Morue. VIVIEN, rue La Fayette, 126, PARIS

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN. Échantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

ST-LEGER TONI-ALCALINE

PURGYL LAXATIF IDÉAL. Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants. Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

cours à ses idées délirantes qui vont servir de canevas à la leçon.

Le Maître renversé dans son fauteuil, les mains jointes, tourné vers le malade, l'interroge, entre dans ses idées, le presse, répond à ses longues divagations avec bonhomie, calme et affabilité. Presque toujours il sait lui imposer confiance. Il aide aux aveux, gardant sans cesse une attitude bienveillante, attentive, intéressée. Il écoute patiemment le malade, le laisse aller d'abord, puis intervient avec douceur pour abréger de trop longues digressions, sourit avec réserve aux bizarreries trop accentuées, sait habilement canaliser le cours souvent tumultueux de cette autoobservation et ramener toujours le sujet au point intéressant,

Puis, le malade parti, il reprend l'observation, la développe, raconte l'histoire le plus souvent attachante et lamentable de ces malheureux, lit leurs longs mémoires, s'aidant d'un lorgnon d'écaille à forme de larges et rondes lunettes qu'il manie comme un face-à-main, entremêle son récit de quelques remarques et plaisanteries anodines provoquées par les excentricités de ces pauvres déments. Et si l'auditoire rit plus bruyamment, il sait le rappeler à la réalité qu'on a tendance à oublier, en disant ce que chacun ressent : « Ce pourrait être drôle, si ce n'était si triste. »

Et ainsi le Maître fait une analyse psychologique soignée, intéressante, attrayante, se limitant surtout aux faits représentatifs. Il s'appuie sur des notes et documents recueillis avec soin, et cependant la leçon semble surtout un exposé clinique sans préparation très stricte, déduit naturellement de l'audition du malade et de l'observation.

Il paraît se servir de ce point de départ pour aboutir à des considérations improvisées et à des conclusions dogmatiques au point de vue de la symptomatologie et du diagnostic, laissant au second plan les chapitres de pathogénie, de thérapeutique, etc.

Et toute la leçon se fait sur un ton de conversation familière.

* * *

Le Professeur ne recherche pas le mot grandiloquent, mais, toujours facile à suivre, il trouve souvent le terme imagé, pittoresque, parfois littéraire. Dans le débit on remarque une certaine lenteur et quelque hésitation de parole qui le fait s'arrêter avant le mot comme pour le chercher. Devant les élèves, comme tout à l'heure avec le malade, il répudie toute allure magistrale et préfère une attitude de douceur et de réserve, une grande simplicité de ton et de tenue.

La voix, d'intensité moyenne, porte bien et partout, d'autant que l'auditoire est très attentif et silencieux. Ici les retardataires sont rares, entrent sans bruit, avec précaution, et la leçon s'achève au bout d'une heure dans une note discrète et mélancolique qui convient à ces lieux témoins de tant de misères morales.

Pierre Maurel.

VARIÉTÉS

Polymastie et tuberculose.

Notre confrère, M. Teizo Iwai, médecin en chef de la Croix-Rouge du Japon à Tokio, a étudié depuis Novembre 1893 la question de la polymastie au Japon, et il a publié sur ce sujet différents mémoires dont l'un a paru dans les *Archives de médecine expérimentale et d'anatomie pathologique*. D'après lui, la polymastie serait assez fréquente au Japon.

Chez les Japonais, contrairement à ce qui existe chez les peuples occidentaux, les mamelles surnuméraires sont situées au-dessus des mamelles normales et plus communément sur le bord antérieur de l'aisselle.

D'après les recherches personnelles de Teizo Iwai la proportion des cas de polymastie est de 1,47 p. 100 chez l'homme et 4,71 pour 100 chez la femme; ce fait, que les mamelles surnuméraires sont plus fréquentes chez la femme que chez l'homme et situées plus souvent du côté gauche que du côté droit, coïncide avec les constatations faites en Europe. Le plus grand nombre de mamelles surnuméraires trouvées chez une personne est de six. Il est certain que la polymastie est héréditaire et que dans plusieurs cas elle est transmise par la mère. Dans une mamelle surnuméraire à développement complet le processus de la sécrétion lactée commence au moment de la parturition et quelquefois se poursuit pendant six mois.

Notre confrère admet comme très probable une étroite relation entre la polymastie et la grossesse multiple.

* * *

Ce qui fait l'intérêt particulier des recherches de notre confrère japonais c'est la coïncidence qu'il a notée de la polymastie avec la tuberculose.

Du 1er Mars 1901 au 31 Mars 1902, c'est-à-dire durant treize mois, sur 1.930 malades examinés, Teizo Iwai a trouvé 96 cas de polymastie, soit 4,97 pour 100.

Sur ces malades, on comptait 1.120 hommes comprenant 32 cas de polymastie ou 2,85 pour 100 et sur les 820 femmes restantes il y avait 64 cas de polymastie, soit 7,7 pour 100. Parmi les 1.930 malades, il y avait 212 cas de tuberculose vraie, comprenant eux-mêmes 22 cas de polymastie, soit 10,8 pour 100. Si on envisage les 41 cas de polymastie rencontrés parmi 1.514 malades non tuberculeux, on a la proportion de 2,71 pour 100 ce qui est le quart du résultat précédent.

D'autre part, sur 204 douteux de tuberculose on a trouvé 33 cas de polymastie, soit 16,17 pour 100. En réunissant les cas de tuberculose vraie et les cas douteux, on compte 416 malades hommes et femmes parmi lesquels on trouve 55 cas de polymastie soit 13,22 pour 100. En comparant ce nombre à celui trouvé chez les non-tuberculeux, nous voyons qu'il est 5 fois plus élevé. D'un autre côté, sur 96 cas de polymastie

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le Bicarbonate de Soude auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses
ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la
Phytine
Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus
Reconstituant Général - Apéritif Puissant
Traitement de l'Insomnie nerveuse
Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure
Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125
1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le
FORTOSSAN
Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait ✓ Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques
Favorise la Croissance
Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour
Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS
C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON. Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine strict. | Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 8, Boulevard St-Martin et Phies.

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phies LALAS, 19, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chlorofor. A 1 MILLIGR. 1 à 3 par jour.

y a 22 tuberculeux avérés, soit 22,91 pour 100, et ur 1.834 cas qui n'offrent pas de polymastie, il y a 90 tuberculeux, soit 10,36 pour 100. Si nous compaons ces deux résultats nous voyons que la proporon dans le premier cas est le double de celle du econd. Teizo Iwai a trouvé également qu'il y avait 5 cas réels ou douteux de tuberculose sur 96 cas de olymastie, soit 57,29 pour 100, et 361 seulement sur .834 sujets n'ayant pas de polymastie, soit 19,68 p. 100, oit le tiers de la première proportion.

Ces divers chiffres semblent prouver qu'il y a beauoup plus de cas de tuberculose chez les personnes yant de la polymastie que chez celles qui ne préentent pas cette anomalie. C'est là un point intéressant à signaler.

PRATIQUE MÉDICALE

L'emploi possible de l'aluminium contre l'hydrargyrisme.

Les ouvriers travaillant dans les mines de ercure ou dans les industries qui mettent en œuvre ce métal ou ses composés, telles que la abrication des sels, de mercure, des glaces, es papiers peints, des couleurs d'aniline, la orure, le damasquinage des fusils, etc., sont oumis à une intoxication spéciale, aiguë ou hronique, qui cause des phénomènes pathoogiques très graves (inflammation de la bouche, remblement, cachexie) pouvant amener rapidement la déchéance et la mort des travailleurs tteints.

On a donc cherché depuis longtemps sans rand succès les moyens de remédier à ces graves nconvénients. Assez récemment, M. Tarugi, en talie, a préconisé l'emploi de l'aluminium comme oyen défensif contre le mercurialisme aigu et hronique.

On sait en effet que l'aluminium, sous l'influence e traces de mercure, s'oxyde très rapidement en fournissant de l'alumine plus ou moins hydratée ; le processus de cette action consiste d'abord dans la formation d'un amalgame d'aluminium très facilement oxydable qui donne, comme produit d'oxydation, de l'alumine et laisse en liberté du mercure qui se combine à une nouvelle quantité d'aluminium pour former de l'amalgame qui subit un nouveau cycle d'oxydation ; et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout l'aluminium ait été oxydé et transformé en alumine. Si l'on recherche le degré de sensibilité de l'aluminium, on constate qu'un fil d'aluminium plongé dans une solution diluée d'un sel de mercure, puis séché, s'oxyde à l'air, même lorsqu'il a été soumis à l'action d'un dix-millième de milligramme de mercure. C'est la réaction chimique la plus sensible qu'on connaisse jusqu'ici pour le mercure, dont elle est spécifique.

De plus, l'aluminium soumis à l'action d'un courant de vapeur de mercure absorbe celui-ci et le retient totalement jusqu'à oxydation complète de l'aluminium.

* * *

Partant de là, M. Tarugi a imaginé un masque façonné de telle sorte que l'air doive traverser des toiles d'aluminium à mailles très fines avant d'arriver jusqu'aux voies respiratoire, ce métal devant retenir ainsi les vapeurs mercurielles répandues dans l'atmosphère et empêcher leur arrivée dans les poumons.

Les différents essais faits par M. Tarugi ont montré que dans une chambre saturée de vapeur de bichlorure de mercure et de mercure, et dans laquelle un sujet présentait rapidement tous les symptômes d'empoisonnement mercuriel aigu, on pouvait séjourner au contraire fort longtemps sans inconvénient quand on était muni d'un masque à l'aluminium. Il y a là une méthode qui peut avoir une portée pratique considérable (*La Nature*).

LIVRES NOUVEAUX

Traité d'hygiène, publié en fascicules sous la direction de MM. Brouardel, Chantemesse et Mosny. — **Hygiène militaire**, par MM. Rouget et Dopter, professeurs agrégés à l'École du Val-de-Grâce. 1 vol. gr. in-8° de 348 pages, avec 69 figures. Broché, 7 fr. 50, cartonné, 9 fr.

M. Chantemesse, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Paris, a bien voulu se charger, après la mort du professeur Brouardel, de diriger de concert avec M. Mosny, l'œuvre du Traité d'hygiène dont nous avons entretenu à plusieurs reprises les lecteurs de *La Presse Médicale*.

Le fascicule 4 vient de paraître; il est consacré tout entier à l'*Hygiène militaire*.

MM. J. Rouget et Ch. Dopter, professeurs agrégés au Val-de-Grâce, étudient toutes les questions concernant la pathologie militaire, l'habillement, les casernes, les hôpitaux, et passent en revue la prophylaxie générale contre les maladies transmissibles dans l'armée. Les médecins, qui ont tous aujourd'hui plus ou moins à s'occuper des questions militaires, trouveront dans ce livre une foule de renseignements précieux. P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1253. — **E. Lefas**. — La technique histo-bactériologique moderne. 1 plaquette in-16 de 96 pages, cartonné. Prix : 1 fr. 50. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

1254. — **J. Visolu-Cornateano**. — La mort par inhibition. 1 vol. in-8°, de 127 pages. Prix : 3 fr. 50. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

1256. — Catalogue et tables des thèses de doctorat en médecine de la Faculté de Paris soutenues pendant l'année scolaire 1905-1906. 1 brochure in-18 de 14 pages. Prix : 1 fr. 25. (*A. Michalon*, éditeur).

1258. — **L. Védy**. — La fièvre bilieuse hémoglobinurique dans le bassin du Congo. 1 vol. gr. in-8°, de 152 pages. (*H. Lamertin*, éditeur, à Bruxelles.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de *Véritable créosote de hêtre* et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
Procédé spécial de fabrication évitant toute irritation des voies digestives
De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.
Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose
Le flacon, 3 fr., **rue de Rennes, 83, Paris**, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII[e] Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie. PARIS (8e).

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
DIONINE-MERCK
SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR et de la TOUX de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

TRAITEMENT **PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE**
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort « *que la* somme *de la* puissance *de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-[illegible] (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Orne, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharm.

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : *3 à 6 mesures par jour.*
Comme préventif : *1 à 3 mesures 10 jours par mois.*

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



LA MANTEGA
NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1er SEPTEMBRE au 1er JUILLET

Station climatérique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).
INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime.

Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrade au plus fort de l'hiver.

Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, s la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique: buanderie à vapeur; système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire prétuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculoses pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péritonéale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe.

Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — DOSE JOURNALIÈRE : 2 à 3 capsules pour les enfants; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phtisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE
du Docteur J. de NITTIS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : *Dr J. de Nittis*

PARIS - Phcie VIAL, 20, rue de Châteaudun.
et principales Pharmacies.

FER GIRARD
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas.* On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine* : 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

● YIN DE PEPTONE ●
De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium.	Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium.	Maladies du cœur.
Lactate de Strontium.	Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline
Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"
Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"
Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.** Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ALBARGINE "CREIL"
Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Cet **excellent antiblennorrhagique** contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1—0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les **affections** du **colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

ALUMNOL "CREIL"
Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

L'**Alumnol**, **naphtol-disulfonate d'aluminium**, est indiqué et énergiquement actif en cas de **plaies suppurantes, d'abcès**, de **plaies cavitaires,** en cas **d'endométrite blennorrhagique**, de **leucorrhée simple**, de **dermatites** superficielles aiguës ou infiltrées chroniques; en cas **d'otite moyenne,** etc. Employé avec succès en **rhino-laryngologie** dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 °/₀.

Les pâtes à 10-20 °/₀ se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes** acuminées.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 °/₀ servent pour les **lavages** en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4-1 °/₀ servent pour des **gargarismes**, des lavages nasaux, etc.

L'Alumnol mélangé à la dose de 10 à 20 °/₀ au talc de Venise et à l'amidon sert comme épispasme.

ORTHOFORME "CREIL"

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'**affections syphilitiques** et **tuberculeuses** du **larynx** et du **pharynx**, en cas de **carcinome** et d'**ulcère stomacaux,** à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

DERMATOL "CREIL"
Topique pour plaies, inodore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

Indiqué à l'**intérieur** en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr **antidiarrhéique. A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, siccatif hâtant la guérison**, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de **plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants**, de **brûlures**, etc.

Pommade au Dermatol de 10 à 20 °/₀. — Emulsion de collodion au Dermatol à 10 °/₀. Epispasme au Dermatol à 20 °/₀ surtout en présence de **sécrétions sudorales** exagérées.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — Un cours pratique d'ophtalmologie aura lieu du 23 Octobre au 17 Novembre prochain.

PROGRAMME DU COURS : *Mardi 23 Octobre*, 3 heures. — M. DE LAPERSONNE : Introduction. Moyens d'exploration de l'œil. Cornée (anat. et physiol.). Kératites en général. Kératite purulente.

Mercredi 24 Octobre, 2 heures. — M. MONTHUS : Kératites superficielles, phycténulaire, herpétique. Pannus. Kératites interstitielles. Kératite neuro-paralytique. Taies, staphylomes, fistules, kératocone.

Jeudi 25 Octobre, 2 heures. — M. CANTONNET : Sclérotique et tissu épiscléral (anatomie). Sclérites, épisclérites, sclérochoroïdites antérieures et postérieures, staphylomes scléreux. Tumeurs du limbe.

Vendredi 26 Octobre, 2 heures. — M. PLEY : Examen de l'œil. Eclairage focal. Ophtalmoscope : notions élémentaires.

Samedi 27 Octobre, 3 heures. — M. DE LAPERSONNE : Conjonctive (structure). Conjonctivites aiguës : examen des principales espèces microbiennes.

Lundi 29 Octobre, 2 heures. — M. PLEY : Examen à l'image droite et à l'image renversée.

Mardi 30 Octobre, 2 heures. — M. CANTONNET : Conjonctivites chroniques. Trachome. Catarrhe printanier. Syphilis et tuberculose de la conjonctive. Ptérygion.

Mercredi 31 Octobre, 2 heures. — M. MONTHUS : Appareil lacrymal (anatomie et physiologie). Infection des voies lacrymales. Dacryocystites, phlegmon péricystique, dacryoadénites, tuberculose, néoplasmes.

Vendredi 2 Novembre, 2 heures. — M. PLEY : Détermination de la myopie et de l'hypermétropie.

Samedi 3 Novembre, 3 heures. — M. DE LAPERSONNE : Paupières (anatomie). Blépharites, dermatoses. Tumeurs. Ectropion, entropion, blépharospasme. Lagophtalmie, ptosis.

Lundi 5 Novembre, 2 heures. — M. PLEY : Astigmatisme. Ophtalmométrie.

Mardi 6 Novembre, 2 heures. — M. CANTONNET : Tractus uvéal (anatomie). Circulation sanguine de l'œil. Courants nutritifs. Tension intra-oculaire. Innervation de l'iris. Séméiologie de la pupille.

Mercredi 7 Novembre, 2 heures. — M. MONTHUS : Des iritis et des iridocyclites : leurs conséquences. Choroïdites et uvéites. Synchisis.

Jeudi 8 Novembre, 2 heures. — M. MONTHUS : Gommes et tumeurs de l'iris. Tumeurs intra-oculaires. Chorio-rétinite syphilitique.

Vendredi 9 Novembre, 2 heures. — M. PLEY : Acuité visuelle. Echelles optométriques. Des verres de lunettes. Diploscope.

Samedi 10 Novembre, 3 heures. — M. DE LAPERSONNE : Des glaucomes.

Lundi 12 Novembre, 2 heures. — M. PLEY : Champ visuel. Périmétrie.

Mardi 13 Novembre, 2 heures. — M. CANTONNET : Rétine, nerf optique, voies optiques (anatomie), neurones, faisceau maculaire. Hémianopsie et amblyopies centrales. Hémorragies. Embolie et thrombose de l'artère centrale.

Mercredi 14 Novembre, 2 heures. — M. MONTHUS : Classification des rétinites et des choriorétinites. Décollement de la rétine. Classification des névrites optiques. Stase, atrophie papillaire.

Jeudi 15 Novembre, 2 heures. — M CANTONNET : Cristallin (anatomie). Les cataractes. Luxations du cristallin.

Vendredi 16 Novembre, 2 heures. — M. MONTHUS : Traumatismes de l'œil, accidents infectieux, ophtalmie sympathique. — Maladies de l'orbite. Phlegmon. Thrombophlébite. Sinusites. Tumeurs de l'orbite.

Samedi 17 Novembre, 3 heures. — M. DE LAPERSONNE : Appareil moteur de l'œil (anatomie). La diplopie, moyens de la reconnaître et de la mesurer. Strabisme et paralysies oculaires.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — A partir du lundi 7 Janvier 1907, sous la direction de M. PIERRE SEBILEAU, professeur agrégé et chirurgien de l'hôpital Lariboisière, MM. P. GIBERT et F. LEMAITRE, assistants, feront une série de 20 conférences cliniques avec examen et présentation de malades.

Ces conférences auront lieu, le matin, à 8 1/4, à la consultation du larynx.

Le prix est de 50 francs.

Pour le versement et l'inscription, prière de s'adresser à M. Paul Gibert, assistant du service, salle Davaine.

Il est recommandé aux médecins ou étudiants de se munir d'un miroir frontal.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

1re *Conférence.* — Généralités. Moyens d'éclairage. Rhinoscopie antérieure et postérieure. Rhinométrie.

2e *Conférence.* — Epistaxis. Hématome de la cloison. Eperons et crêtes de la cloison. Déviations.

3e *Conférence.* — Corps étrangers des fosses nasales. Rhinite hypertrophique. Queues de cornet. Rhinite spasmodique. Rhinite atrophique.

4e *Conférence.* — Adénoïdite aiguë. Adénoïdite chronique. Catharre du cavum. Végétations adénoïdes.

5e *Conférence.* — Sinusites maxillaires aiguës et chroniques.

6e *Conférence.* — Sinusites frontales. Sphéno-ethmoïdites.

7e *Conférence.* — Tuberculose nasale. Syphilis du nez aux trois périodes.

8e *Conférence.* — Tumeurs des fosses nasales. Polypes muqueux. Tumeurs malignes. Tumeurs du cavum.

9e *Conférence.* — Hypertrophie des amygdales. Amygdalites chroniques. Phlegmon sus-amygdalien. Ulcérations de la langue et du voile du palais.

10e *Conférence.* — Pharyngites aiguës et chroniques. Ulcérations du pharynx. Abcès rétro-pharyngiens.

11e *Conférence.* — Examen du conduit auditif externe. Affections du pavillon. Hématome du pavillon. Corps étrangers du conduit. Furoncle du conduit.

12e *Conférence.* — Epreuves de l'audition. Examen du tympan. Variations de couleur. Variations de tension. Maladies de la trompe d'Eustache. Cathétérisme.

13e *Conférence.* — Otites moyennes aiguës. Paracentèse. Mastoïdite aiguë.

14e *Conférence.* — Otites moyennes chroniques suppurées. Cholestéatome.

15e *Conférence.* — Otites moyennes chroniques sèches. Oto-sclérose. Synéchies. Labyrinthisme.

16e *Conférence.* — Examen de l'oro-pharynx. Base de la langue. Hypertrophie de l'amygdale linguale. Examen du larynx.

17e *Conférence.* — Trouble de la motilité des cordes. Laryngites aiguës et chroniques.

18e *Conférence.* — Tuberculose laryngée. Syphilis du larynx. Sténoses.

19e *Conférence.* — Polypes du larynx. Cancer du larynx.

20e *Conférence.* — Trachéotomie. Bronchoscopie supérieure et inférieure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Sont promus au grade de médecin inspecteur, MM. les médecins principaux de 1re classe Darricarrère, directeur du service de santé de la division d'Alger ; Antony, sous-directeur de l'école d'application du service de santé militaire, médecin-chef de l'hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce.

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus triels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(*Créosote, Goudron & Tolu*)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux r pas.
E. TROUETTE 15. r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE. 15. r. d s Immeubles-Industriels. PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industr els, PARIS

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON
PERSODINE LUMIÈRE
Excitant énergique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.
CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antithermique énergique non toxique
Doses : 0gr20 à 1gr50 en comprimés.
HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Antiseptique, Antisyphilitique organo-métallique
HEMOPLASE LUMIÈRE
Plasmothérapie sanguine des cachexies

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

"IODALIA"
Nouvelle Médication
Iodée
intensive
Combinaison organique
Granulé *stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.*
DOSAGE élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par *cuillerée à café.*
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
DOSE : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Ech. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fs St-Denis, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades ; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX.*
EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à* l'Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur* l'HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*
HISTOGÉNOL NALINE
à base de Nucléarrhine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
FORMES :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Elixir : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.
INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.
KIPSOL prévient guérit le CORYZA
CORYZA SIMPLE et CORYZA des ICODURES. — BLANCARD, Paris.

IODOL
Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
Brochures et Echantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris)

Au grade de médecins-majors de 1re classe, MM. Guirlet, yret, Coste, Pierron, médecins-majors de 2e classe.
Au grade de médecins-majors de 2e classe, MM. Sylstre, Romieu, Brunetière, Loubet, Talon, médecins aides-ajors de 1re classe.

— Sont arrêtées les mutations suivantes : médecins-ajors de 2e classe MM. Vialle : passe à l'hôpital militire de Nice; Haury est maintenu au 107e régiment d'inanterie; Viallet passe aux hôpitaux de la division d'Alr pour être détaché aux batteries d'artillerie d'Husseinsy; Schmerber passe au 2e régiment de zouaves; Foley sse aux hôpitaux de la division d'Oran; Grall passe aux pitaux de la division d'Oran; Camus passe au 1er rément de tirailleurs algériens; Julia passe à l'Ecole ilitaire préparatoire d'infanterie des Andelys; Vennin sse au 60e régiment d'infanterie; Guéricolas, est désié pour le 5e bataillon de chasseurs à pied; Ehrmann t désigué pour le 13e régiment d'infanterie.
Médecins aides-majors de 1re classe, MM. Guyard passe 19e régiment d'infanterie; Baillard, passe au 73e rément d'infanterie; Dreyfus, passe aux hôpitaux de la vision d'occupation de Tunisie; Giraud, passe aux hôpiux de la division d'occupation de Tunisie.
Médecin aide-major de 2e classe, MM. Orticoni, passe 15e chasseurs à cheval; Charton passe au 155e régient d'infanterie.

Service de santé de la marine. — M. le médecin incipal Rétière du port de Brest, qui avait été détaché service médical du port de Lorient, devra être dirigé médiatement sur son port d'attache.

— M. le médecin de 2e classe Le Couteur du port de herbourg est autorisé à prendre part au concours qui ouvrira à Brest, le 15 Octobre 1906, pour l'emploi de rosecteur d'anatomie à l'école annexe de médecine nade de ce port.

— M. le médecin de 1re classe Souls du port de Toulon, tuellement médecin-major du *Kléber*, passera sur le *Deix* à l'arrivée de ce bâtiment à Toulon, pour y comléter ses deux années d'embarquement.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont prous dans le corps de santé des troupes coloniales : au rade de médecin principal de 1re classe, M. le médecin rincipal de 2e classe Collomb; au grade de médecinajor de 2e classe, M. le médecin aide-major de 1re classe onjarret.

— Sont affectés : en France, MM. Touin, médecinajor de 1re classe; Crenn, Rouffiandis, Boullet, Rapuc, édecins-majors de 2e classe; Grilliat, Deunff, Lacroix, avarre, Gallier, médecins aides-majors de 1re classe.

— MM. les médecins aides-majors de 1re classe Patterson et Brimont sont temporairement affectés au 23e régiment d'infanterie coloniale, à Paris, en vue d'accomplir un stage à l'école d'odontologie de M. Siffre.

CONCOURS

Externat. — ANATOMIE. — *Séance du 9 Octobre.* — *Artère poplitée et ses branches.* — Ont obtenu: MM. Buquet, 18; Bobeau, 15; Bartissol, 3; Bodineau, 18; Baudson, 3; Chamorro, 17; Chastel, 14; Chatelin (Charles), 14; Bierer, 13; Gillard (Joseph), 14; Cuvillier, 13; Adain, 12; Bleynie, 13; Daniel, 9; Belot, 12; Adler, 5; Chamlian, 6; Caubet, 6; Corre, 5; Chaillot, 5. — *Absents* : Mme Alexeieff, MM. Chevaliéras, Bichai, Blanc (Georges), Chabrun.

Séance du 11 Octobre. — *Configuration extérieure et rapports de l'estomac.* — Ont obtenu : MM. Butel, 18; Cornet, 10; Albertin, 11; Bougot, 16; Châtelain (Marcel), 9; Bertrand, 8; Caux, 13; Chardin, 15; Amblard, 13; Bougeant, 15; Clogne, 7; Bulliard, 7; Bouquier, 12; Chapuis, 11; Beloux, 13; Alvergnat, 10; Barthélemy, 17; Butin, 18; Barnathan, 7; Brunet, 5; Bruel, 15; Besnard, 7; de Baric, 6. — *Absents* : MM. Beugnon, Combres, Cadre.

PATHOLOGIE. — *Séance du 10 Octobre.* — *Vaccination contre la variole.* — Ont obtenu : MM. Rabourdin, 10; Mlle Schelhtmann, 8; Vennemouze, 15; Verrier, 12; Vielle, 19; Rehm, 16; Wilmet, 12; Pollet, 14; Renault, 10; Toffin, 14; Zaepffel, 13; Mlle Ricard, 15; Plaisant, 15; Pagnel, 16; Thierry, 14; Riou, 15; Scheurer, 10; Schilmann, 12; Sauty, 10; Reinhold, 9. — *Absents* : Mlle Pokitonow, MM. Solau, Pinon, Saulgeot, Tinayre, Rigoulet.

Ecoles annexes de médecine navale. — Les concours annoncés au *Journal Officiel* des 14 Août et 28 Septembre derniers pour deux emplois de professeur de physique biologique dans les Ecoles annexes de médecine navale de Brest et de Toulon auront lieu dans ce dernier port le 25 Octobre 1906.

Les noms des candidats désireux de prendre part à ces concours devront être télégraphiés au ministère cinq jours au moins avant la date d'ouverture des épreuves.

— Le jury du concours qui aura lieu à Toulon le 25 Octobre pour deux emplois de professeur de physique biologique dans les écoles annexes de médecine navale sera composé comme suit : M. l'inspecteur général du service de santé, président; M. le pharmacien en chef de 1re classe Sauvcire, membre; M. le pharmacien principal Le Ray, membre.

Les noms des candidats désireux de prendre part à ce concours devront être télégraphiés au ministère cinq jours au moins avant la date d'ouverture des épreuves.

— Un concours pour un emploi de prosecteur d'anatomie à l'École annexe de médecine navale de Brest sera ouvert dans ce port le 15 Octobre 1906.

RENSEIGNEMENTS

Conférence privée d'internat. — MM. Roux-Berger et Pottet, internes des hôpitaux, commenceront le 1er Novembre prochain une conférence privée d'internat S'adresser à M Pottet, interne à l'hôpital Broca.

Cours pratique des maladies des voies urinaires du Dr Banzet, anc. chef de clin. à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique (leçons pratiques les mardi et vendredi soir, à 8 h. à la clinique, 76, quai des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseig. s'adr. au Dr Banzet, 19, rue de Lille.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et *la plus sûre* la médication phosphorique indiquée contre l'hypoacidité et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

Peroxydes Médicinaux
MgO2 HOPOGAN — ZnO2 EKTOGAN
Pour éviter les contrefaçons, exigez sur chacun des produits les triangles ci-contre
Peroxydes de magnésium Prescrivez HOPOGAN
» zinc » EKTOGAN

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

KÉPHIR SALIÈRES
Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.
« *Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments* (Méthode DUCLAUX, Direct. Inst. Pasteur) *et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger.* »
Dr DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.
Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE DE PONTOISE (S.-&-O.). — Dépôt : ADRIAN, Rue de la Perle, PARIS.
DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

BRONCHITES COQUELUCHE GRIPPE LARYNGITES
SIROP de A. GIGON à la NARCÉINE Pure
Très bien Supporté par les Enfants
DOSE : Enfants 4 à 5 cuill. à café. — Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

"Ulmarène" *Médication salicylée locale.*
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle
pour le traitement du **RHUMATISME sous toutes ses formes.**
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.
VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie

Marque déposée — INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES — Marque déposée
Toujours formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
F E R — SCROFULE — I O D E
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. *Refuser* les IMITATIONS DANGEREUSES.

MgO2 **HOPOGAN** USAGE INTERNE
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS *exclusivement préparés pour* L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN ZnO2 USAGE EXTERNE

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun
Accident toxique
à redouter.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arr.)
TÉLÉPHONE **517-12**

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABÉLONYE
PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "Digitaline".

COMPRIMÉS de DIGITALE
H. ÉCALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de **Poudre de Feuilles de Digitale** titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline** crist. par 1,000 gram. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de **Digitaline cristallisée**.
Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
Titrée au millième.
Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**.
(20 à 50 gouttes en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABÉLONYE
Titré
à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée**.

GRANULES de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
au dixième de milligr. *(4 à 10 en 24 heures)*
AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière.)
de **DIGITALINE** crist. **H. ÉCALLE**
Titrées au cinquième de milligr.
(1 à 4 en 24 heures)
(Directement injectables).
LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

Téléphone 264-56 — *MAISON FONDÉE EN 1882* — Adresse télégraphique : LILIPUT-PARIS

E. KRAUSS
Optique et Mécanique de Précision
PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS
SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

MICROSCOPES & ACCESSOIRES
KRAUSS — BAUSCH — LOMB
Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision



Combinaison dite "Pasteur Koch"
RECHERCHES MÉDICALES ET BACTÉRIOLOGIQUES

Stand BBII (avec condensateur Abbe, ouv. num. 1,20).	150 fr.
Objectifs achromatiques à grande ouvert. f = 18 m/m.	19 »
Objectifs achromatiques à grande ouvert. f = 4,3 m/m.	37 »
Immersion homogène 1/12, f = 2,1 m/m (ouv. num. 1,32).	124 »
Triple revolver	25 »
Oculaires Huyghens f = 37 et 25 m/m	12 »
L'Appareil complet en armoire	**367** fr.

Grossissements : 60, 87, 290, 385, 675, 900 diamètres.

Notre nouveau Stand AABI (crémaillère, pignon, vis micrométrique, condensateur Abbe, ouv. numérique 1,00), à **85** *francs, peut recevoir la même combinaison optique que le Stand BBII indiqué ci-dessus.*

MODÈLES SPÉCIAUX
pour Laboratoires, Pharmaciens, Étudiants et P. C. N.

Sur demande envoi GRATIS et FRANCO de nos Catalogues :
Microscopes et Accessoires, Centrifugeurs universels, Microtomes, Préparations microscopiques, Chambre microphotographique, Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie, Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

HEYDEN

Traitement de la Blennorragie

par le **NOVARGAN** — *NOUVEAU PROTÉINATE D'ARGENT* (à 10 p. 100).
très soluble, n'irritant pas la muqueuse ;
supportable à hautes concentrations. (Injections et lavages avec solution de 1/2 à 2 p. 100;
Traitement abortif par instillations avec solution à 15 p. 100) ;

et le **BLENAL** — *ÉTHER CARBONIQUE NEUTRE du SANTALOL*
Contenant 94 pour 100 de Santalol.

Aucune irritation ; tolérance parfaite de l'estomac et des reins ; insipide et inodore.

15 Gouttes trois fois par jour. — Prescrire : BLENAL, 1 Flacon de 15 gr.

ÉCHANTILLONS GRATUITS ET LITTÉRATURE A MM. LES DOCTEURS CHEZ LE REPRÉSENTANT-DÉPOSITAIRE DES PRODUITS " HEYDEN "
M. Paul ROUVEL, *3, rue du Plâtre, Paris* (4e).

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.